

Mecânica Quântica – Série 2

Curso de Engenharia Física Tecnológica – 2007/2008

2.1 Em muitos dos problemas seguintes aparecem integrais gaussianos. Seja

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$

a) Utilize o *Mathematica* para verificar que

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) = 1$$

b) Considere agora a função

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

Utilizando mudanças de variáveis apropriadas mostre que está normalizada e que

$$\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = \sigma^2$$

onde

$$\langle x^n \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx x^n g(x)$$

2.2 *Gasiorowicz 2.1*

Sugestões/Soluções:

1. O integral

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathcal{N}}{k^2 + \alpha^2} e^{ikx} dk$$

faz-se utilizando o teorema dos resíduos. O resultado é

$$\psi(x) = \mathcal{N} \frac{\pi}{\alpha} \left[e^{-\alpha x} \theta(x) + e^{\alpha x} \theta(-x) \right]$$

Pode verificar este resultado com o *Mathematica* pois $\psi(x)$ está relacionado com a Transformada de Fourier de $A(k)$ através de

$$\psi(x) = \sqrt{2\pi} \text{FourierTransform}[\mathcal{N}/(k^2 + \alpha^2), k, x]$$

2. Utilize o *Mathematica* para fazer os integrais e obter:

$$\begin{aligned} \Delta k &= \sqrt{\langle k^2 \rangle - \langle k \rangle^2} = \alpha \\ \Delta x &= \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \frac{1}{\sqrt{2}\alpha} \end{aligned}$$

2.3 Gasirowicz 2.2

2.4 Para os dois problema seguintes deve usar o resultado da Eq. 2.13 do livro

$$|\psi(x, t)|^2 = \mathcal{N}^2 \frac{2\pi}{\sqrt{\alpha^2 + 4\beta^2 t^2}} e^{-\frac{\alpha(x - v_g t)^2}{\alpha^2 + 4\beta^2 t^2}}$$

onde

$$v_g = \left(\frac{\partial \omega(k)}{\partial k} \right)_{k=k_0}, \quad \beta = \left(\frac{\partial^2 \omega(k)}{\partial k^2} \right)_{k=k_0},$$

a) Mostre que para $t = 0$ a largura deste pacote de ondas gaussiano é $\sigma_0 = \sqrt{\alpha/2}$, onde, como habitualmente, $\sigma = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$. Note que esta definição de largura difere ligeiramente da dada no livro. Utilize o Mathematica para fazer os integrais.

b) Mostre que $\sigma(t) = \sigma_0 \sqrt{1 + \frac{4\beta^2 t^2}{\alpha^2}}$.

c) A constante \mathcal{N} destina-se a normalizar a função de onda. Mostre que $\mathcal{N} = (\alpha/4\pi^3)^{1/4}$ e que não depende do tempo.

2.5 Gasirowicz 2.6

2.6 Gasirowicz 2.7

2.7 Gasirowicz 2.11

2.8 Gasirowicz 2.15

[Resposta: $N = \frac{1}{\sqrt{4\pi k}}$]

2.9 Gasirowicz 2.16

[Resposta: $\langle x^{2n+1} \rangle = 0, \langle x^{2n} \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\alpha^n} \Gamma(n + 1/2)$]

2.10 Gasirowicz 2.17

Comentários/Soluções:

1. Obtemos para $\psi(p)$:

$$\psi(p) = \frac{1}{\sqrt{\hbar}} \frac{1}{(\alpha\pi)^{1/4}} e^{-\frac{p^2}{2\alpha\hbar^2}}$$

2. Verifique que $\psi(x)$ e $\psi(p)$ estão normalizadas.

3. A igualdade em

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

só ocorre para funções de onda gaussianas.

2.11 Gasirowicz 2.18

2.12 Adaptado de Griffiths 1.18

Em geral, a mecânica quântica é relevante quando o comprimento de onda de de Broglie, $\lambda = h/p$, é maior que o tamanho característico do sistema, d . Em equilíbrio térmico à temperatura absoluta T , a energia cinética média é

$$T = \frac{p^2}{2m} = \frac{3}{2}k_B T$$

onde $k_B = 1.380 \times 10^{-23} \text{ J/K} = 8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$ é a constante de Boltzmann.

a) Mostre que o comprimento de de Broglie típico é dado por

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{3mk_B T}} = 6.23 \left(\frac{m_e}{m}\right)^{1/2} \left(\frac{300 \text{ K}}{T(\text{ K})}\right)^{1/2} \text{ nm}$$

b) Sabendo que o espaçamento típico dos sólidos e líquidos é $d \simeq 0.3 \text{ nm}$, verifique que para as temperaturas usuais os electrões livres nos sólidos devem obedecer à mecânica quântica enquanto que os núcleos não. Tome o sódio como exemplo com $m_{NA} \simeq 23m_p \simeq 42300m_e$. Verifique que o hélio abaixo de 4 K é uma excepção.

c) Mostre que os átomos num gás ideal devem obedecer à mecânica quântica para temperaturas tais que

$$T < \frac{1}{k_B} \left(\frac{h^2}{3m}\right)^{3/5} P^{2/5}$$

onde P é a pressão. **Sugestão:** Use a lei dos gases perfeitos, $PV = Nk_B T$, para deduzir o espaçamento interatómico num gás. Verifique com o hélio à pressão atmosférica.

d) Use os resultados da alínea c) para se decidir se o hidrogénio no espaço interestelar, onde $d = 1 \text{ cm}$ e $T \simeq 3 \text{ K}$ tem comportamento quântico.